


28.12.2018

НД РФ
29 47 - 20 15



ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ПИНОСОЛ®

Торговое название препарата: ПИНОСОЛ®

Лекарственная форма: капли назальные

ОПИСАНИЕ

Прозрачная жидкость от синего до зелено-синего цвета с ментолово-эвкалиптовым запахом.

СОСТАВ

<i>Активные вещества:</i>	<i>на 10 мл</i>
масло сосны обыкновенной	0,3442 г
масло эвкалиптовое	0,0459 г
тимол	0,0029 г
альфа-токоферола ацетат	0,1560 г
масло мяты перечной	0,0917 г
гвайазулен	0,0018 г

Вспомогательные вещества: бутилгидроксианизол, макрогола и глицеридов абрикосового масла эфиры (лабрафил М-1944-CS), масло растительное.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА

Деконгестанты и другие средства для наружного применения. Прочие препараты для лечения заболеваний носа.

Код АТХ: R01AX30

ФАРМАКОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ФАРМАКОДИНАМИКА

Активные вещества препарата благодаря своей биологической активности оказывают противовоспалительное, антисептическое, гиперемическое действие, а также стимулируют грануляцию и эпителизацию. Ментол, тимол, эфирные масла сосны обыкновенной и эвкалипта оказывают антимикробное действие. Гиперемический эффект развивается в результате местного действия, когда высвобождаются естественные медиаторы организма (например, брадикинин), вызывающие вазодилатацию.

Действие витамина Е проявляется в отношении образования грануляции и регенерации.

ФАРМАКОКИНЕТИКА

Фармакокинетические свойства отдельных компонентов препарата полностью не выяснены. Из-за растворимости в липидах эфирные масла всасываются в пищеварительном тракте, кожей и слизистой оболочкой.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Острые и хронические воспалительные заболевания слизистых оболочек носа и носоглотки, сопровождающиеся сухостью слизистых оболочек носа;
- Состояния после оперативного вмешательства в полости носа – по назначению врача (в условиях стационара и амбулаторно);
- Ингаляция активных веществ Пиносола капли благоприятно влияет на лечение воспаления верхних дыхательных путей (ларингит, трахеит, бронхит).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Местно. Взрослым препарат закапывают в первый день по 2-3 капли в каждый носовой ход

28.12.2018

2947 - 2015

с интервалами в 1 - 2 часа. В последующие дни по 2-3 капли в каждый носовой ход 3 - 4 раза в сутки. Детям от 3 лет закапывают по 1-2 капли 3 - 4 раза в день.
Применение препарата для ингаляций взрослым и детям после 12 лет: для этого 2 мл (50 капель) закапывают в ингалятор. Ингаляции рекомендуется проводить 2 - 3 раза в день.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, аллергический ринит, детский возраст до 3 лет.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

Избегать контакта препарата со слизистой глаз. Соблюдать особую осторожность при использовании препарата у детей.

При частом и/или длительном вдыхании может развиваться сухость слизистой оболочки дыхательных путей.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ

Возможно применение препарата во время беременности и в период грудного вскармливания (лактации) с осторожностью и по рекомендации врача.

ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ДРУГИМИ МЕХАНИЗМАМИ

Использование препарата не влияет на скорость реакции.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Как любое лекарственное средство, Пиносол может оказывать нежелательные реакции, которые в зависимости от частоты возникновения, классифицируются на категории: очень часто ($\geq 1 / 10$), часто ($\geq 1 / 100$ до < 10), редко (от $\geq 1 / 1000$ до $< 1/100$), редко (от $\geq 1 / 10000$ до $< 1/1000$), очень редко ($< 1/10000$), неизвестно (по имеющимся данным).

Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: неизвестно – зуд, жжение, гиперемия или отек слизистой оболочки носовой полости; сухость слизистой оболочки носовой полости; назальный дискомфорт.

Нарушения со стороны иммунной системы: неизвестно – гиперчувствительность к компонентам препарата.

При появлении нежелательных явлений или других необычных реакций, не описанных в инструкции, необходимо обратиться к врачу.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Случаи передозировки препарата при местном применении не описаны. При случайном приеме препарата внутрь лечение симптоматическое.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Данных о взаимодействии препарата ПИНОСОЛ с другими лекарственными средствами не получено.

ФОРМА ВЫПУСКА

Капли назальные.

По 10 мл во флаконах коричневого стекла, снабженных резиновой пипеткой с крышкой. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещен в картонную пачку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

28.12.2018

2947 - 2015

В защищенном от влаги и света месте при температуре от 15 °С до 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта.

ЗАЯВИТЕЛЬ

АО «Санофи Россия»

1255009, Москва, ул. Тверская, 22

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Санека Фармасьютикалс а.с., Нитрианска 100, 920 27 Глоговец, Словацкая Республика.

Претензии по качеству лекарственного препарата и сообщения о нежелательных реакциях направлять:

Представительство АО «Sanofi-Aventis Groupe» Французская Республика в Республике Беларусь

220004 Минск, ул. Димитрова 5, офис 5/2, тел./факс: (375 17) 203 33 11.