


ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
(информация для пациента)



Аира корневища, измельченное сырье 100 г или 80 г в пачке
Asori calami rhizoma

Общая характеристика:

кусочки корневищ различной формы, проходящие сквозь сито (5600). Цвет желтоватый или розоватый, иногда зеленоватый. Запах сильный, ароматный.

Аира корневища содержат эфирное масло, горький гликозид акорин, дубильные вещества и другие биологически активные вещества.

Форма выпуска. Измельченное сырье.

Фармакотерапевтическая группа. Лекарственное средство для повышения аппетита.

Фармакологические свойства. Настой аира корневищ, воздействуя на окончания вкусовых рецепторов, рефлекторно усиливает секрецию желудочного сока, повышает аппетит, способствует улучшению пищеварения. Лекарственное средство оказывает спазмолитическое действие.

Показания к применению. В комплексной терапии функциональных расстройств пищеварительного тракта (отсутствие аппетита, снижение секреторной функции желудка).

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

Способ применения и дозы. 10 г (2 столовые ложки) сырья помещают в эмалированную посуду, заливают водой комнатной температуры 200 мл (1 стакан), закрывают крышкой, нагревают в кипящей воде (водяной бане) 15 мин. Охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают внутрь в теплом виде по 1/4 стакана 3-4 раза в день за 30 мин до еды.

Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Противопоказания. Повышенная индивидуальная чувствительность к веществам, содержащимся в лекарственном средстве, повышенная

кислотность желудочного сока, беременность, период кормления грудью, детский возраст до 18 лет.

Побочное действие. Аллергические реакции. В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Передозировка. Информация о случаях передозировки отсутствует. В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Применение у детей. Лекарственное средство противопоказано детям до 18 лет.

Применение во время беременности и кормления грудью. Лекарственное средство противопоказано женщинам во время беременности и лактации.

Меры предосторожности. Следует избегать длительного применения лекарственного средства. Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Влияние на способность управления автомобилем и работу с движущимися механизмами. Исследования не проводились.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Снижает эффективность антацидов, блокаторов H₂-рецепторов (ранитидина, фамотидина). В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Условия и сроки хранения. В защищенном от влаги и света месте при температуре 15°C–25°C. Приготовленный настой при температуре от 8°C до 15°C – не более 2 суток.

Срок годности. 3 года.

Условия отпуска. Отпускают без рецепта.

Упаковка. По 100 г или 80 г в пачке картонной с внутренним пакетом бумажным. В каждую пачку картонную вкладывают листок-вкладыш с информацией для пациента.

Производитель. ООО «НПК Бiotест».

Адрес. Республика Беларусь, 230014, г. Гродно, ул. Гожская, 2.

Тел. 8 (0152) 68-45-79.

Сайт: www.biotest.by

