


ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
(информация для пациента)



Шалфей листья, измельченное сырье 50 г или 40 г в пачке
Salviae officinalis folium

Общая характеристика:

кусочки листьев различной формы, густо опушенные, проходящие сквозь сито (5600). Цвет листьев зеленый, серовато-зеленый или серовато-белый.

Шалфей листья содержат эфирное масло (*α*-пинен, цинеол, туйон, камфора и др.), дубильные вещества, флавоноиды, олеаноловую и урсоловую кислоты, другие биологические вещества.

Форма выпуска. Измельченное сырье.

Фармакотерапевтическая группа. Прочие средства для местного лечения заболеваний полости рта.

Фармакологические свойства. Средство растительного происхождения. Оказывает противовоспалительное, вяжущее, противомикробное действие.

Показания к применению.

Местно: симптоматическое лечение воспалительных заболеваний полости рта и глотки.

Наружно: симптоматическое лечение легких воспалительных заболеваний кожи.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

Способ применения и дозы. 5 г (1 столовая ложка) измельченных листьев помещают в эмалированную или другую подходящую посуду, заливают 200 мл (1 стакан) воды комнатной температуры, закрывают крышкой и нагревают в кипящей воде (водяной бане) 15 мин. Охлаждают 45 мин при комнатной температуре, процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Местно: для полосканий полости рта и глотки по 1/2-1 стакану настоя в теплом виде 2-4 раза в день.

Наружно: для примочек, орошений 2-4 раза в день.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

Применение во время беременности и кормления грудью. Безопасность применения во время беременности и лактации не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных применять во время беременности и

лактации не рекомендовано. Туйон, входящий в состав листьев шалфея, может оказать неблагоприятное влияние на течение беременности.

Применение у детей. В связи с отсутствием достаточных данных применять у детей до 18 лет не рекомендовано.

Побочное действие. Аллергические реакции, контактный дерматит. В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Влияние на способность управления автомобилем и работу с движущимися механизмами. Прием лекарственного средства внутрь может повлиять на способность управлять автомобилем и работать с механизмами. При случайном приеме внутрь пациентам не рекомендовано управлять автомобилем или работать с техникой.

Противопоказания. Гиперчувствительность, бронхиальная астма. Беременность, период лактации, детский возраст до 18 лет.

Передозировка. При местном и наружном применении передозировка маловероятна. При случайном приеме внутрь в высоких дозах (более 15 г листьев шалфея) возможно появление ощущения жара, развитие тахикардии, головокружения и эпилептических судорог. Лечение симптоматическое.

Меры предосторожности. Не рекомендуется применять препараты листьев шалфея длительно (наружно – более 2 недель, местно – более 1 недели). Если во время применения лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Прием препаратов шалфея внутрь может повлиять на эффекты лекарственных средств, действующих через ГАМК-рецепторы (например, барбитураты, бензодиазепины). При приеме внутрь препараты шалфея могут взаимодействовать с гипогликемическими и противосудорожными средствами, усиливать седативное действие других лекарственных средств и алкоголя, могут влиять на всасывание железа и других минералов. В случае одновременного применения других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Условия и сроки хранения. Хранить в защищенном от влаги и света, недоступном для детей месте при температуре 15°C–25°C. Приготовленный настой при температуре от 8°C до 15°C – не более 2 суток.

Срок годности. 2 года.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОм ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Условия отпуска. Отпускают без рецепта.

Упаковка. По 50 г или 40 г в пачке картонной с внутренним пакетом бумажным. В каждую пачку картонную вкладывают листок-вкладыш с информацией для пациента.

Производитель. ООО «НПК Биотест».

Адрес. Республика Беларусь, 230014, г. Гродно, ул. Гожская, 2.

Тел. 8 (0152) 68-45-79.

Сайт: www.biotest.by

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь