

Листок-вкладыш – информация для потребителя
ДИМЕКСИД-БЕЛМЕД, жидкость для наружного применения
Действующее вещество: диметилсульфоксид

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что собой представляет препарат ДИМЕКСИД-БЕЛМЕД и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата ДИМЕКСИД-БЕЛМЕД
3. Применение препарата ДИМЕКСИД-БЕЛМЕД
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата ДИМЕКСИД-БЕЛМЕД
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

**1. Что собой представляет препарат ДИМЕКСИД-БЕЛМЕД
и для чего его применяют**

ДИМЕКСИД-БЕЛМЕД является лекарственным препаратом для наружного применения, который обладает противовоспалительными, болеутоляющими, противомикробными и фибринолитическими (способствует разжижению крови) свойствами и применяется в лечении следующих заболеваний:

- снятие болевого синдрома при комплексной терапии воспалительных заболеваний опорно-двигательного аппарата (ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева, деформирующий остеоартроз, артропатия, радикулит);
- лечение ушибов, повреждения связок, воспалительных отеков, травматических инфильтратов, гнойных ран, ожогов, абсцессов;
- в составе комплексной терапии узловатой эритемы, экземы, рожистого воспаления, трофических язв, тромбоза, акне, пиодермии, стрептодермии, фурункулеза, фолликулитов, склеродермии;
- приживление пересаженных кожных ауто- и гомотрансплантатов в кожно-пластической хирургии;
- консервирование кожных гомотрансплантатов.

**2. О чем следует знать перед применением
препарата ДИМЕКСИД-БЕЛМЕД**

Не применяйте ДИМЕКСИД-БЕЛМЕД, если у Вас имеется одно из следующих противопоказаний:

- повышенная чувствительность (аллергия) к действующему веществу диметилсульфоксиду;
- нарушение функции печени и/или почек;
- выраженная сердечно-сосудистая недостаточность;
- выраженный атеросклероз;
- стенокардия (резкая боль или дискомфорт в области груди, вызванные недостатком

- кровоснабжения в определенном участке сердца);
- глаукома (заболевание глаза, при котором повышается внутриглазное давление);
- катаракта (помутнение хрусталика глаза);
- инфаркт миокарда (острое состояние, которое возникает в результате повреждения или отмирания части сердечной мышцы);
- инсульт (заболевание, при котором по тем или иным причинам нарушается кровоснабжение определенного участка мозга);
- кома (угрожающее жизни состояние с отсутствием сознания и реакций на любые раздражители);
- детский возраст до 12 лет;
- беременность или кормление грудью.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата ДИМЕКСИД-БЕЛМЕД проконсультируйтесь с лечащим врачом, при наличии следующих факторов риска:

- у Вас тяжелые аллергические заболевания;
- у Вас ишемическая болезнь сердца;
- Вы применяете или недавно применяли какой-либо другой препарат, включая препараты, которые отпускаются без рецепта врача.

Не следует наносить водный раствор диметилсульфоксида на открытые раны и кожу с проявлениями аллергии. Не следует наносить водный раствор диметилсульфоксида в концентрации более 20 % на кожу лица. Следует избегать попадания лекарственного препарата на слизистую оболочку глаз. При случайном попадании необходимо немедленно промыть водой.

Перед началом применения лекарственного препарата Ваш врач может провести тест на лекарственную непереносимость ДИМЕКСИД-БЕЛМЕД. Если результаты теста будут неудовлетворительными, то данный препарат Вам применять нельзя.

При возникновении аллергических реакций на ДИМЕКСИД-БЕЛМЕД применение лекарственного препарата следует прекратить и немедленно обратиться к врачу.

Другие препараты и препарат ДИМЕКСИД-БЕЛМЕД

Сообщите лечащему врачу, если Вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать любые другие препараты. Это относится к любым растительным препаратам или препаратам, которые Вы купили без рецепта врача.

Некоторые препараты можно применять совместно с препаратом ДИМЕКСИД-БЕЛМЕД, а другие – могут вызывать нежелательные реакции при применении с препаратом ДИМЕКСИД-БЕЛМЕД.

ДИМЕКСИД-БЕЛМЕД может усиливать всасывание и повышать эффективность перечисленных ниже лекарственных препаратов для местного применения:

- гепарин;
- нестероидные противовоспалительные средства;
- противомикробные препараты: аминогликозиды, бета-лактамы, антибиотики, хлорамфеникол, рифампицин, гризеофульвин (повышается чувствительность микроорганизмов к данным препаратам);
- этанол;
- инсулин;
- средства для общей и местной анестезии.

Лечащий врач решит, следует ли использовать ДИМЕКСИД-БЕЛМЕД в сочетании с этими и другими лекарственными препаратами.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что можете быть беременны, или

планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. Применение препарата во время беременности и кормления грудью противопоказано.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Побочные эффекты препарата ДИМЕКСИД-БЕЛМЕД (см. раздел 4) могут повлиять на вождение и выполнение других задач, требующих повышенного внимания. Соблюдайте осторожность и откажитесь от вождения, если Вы чувствуете себя плохо, или если врач порекомендовал Вам сделать это.

3. Применение препарата ДИМЕКСИД-БЕЛМЕД

Всегда применяйте этот препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Режим дозирования

Рожистое воспаление и трофические язвы: жидкость применяют в виде 30-50 % водного раствора диметилсульфоксида 2-3 раза в сутки.

Экзема, диффузные стрептодермии: компрессы с 40-90 % водным раствором диметилсульфоксида.

Гнойничковые заболевания кожи: применяют 40 % водный раствор диметилсульфоксида.

Местное обезболивание: рекомендуется компресс с 25-50 % водным раствором диметилсульфоксида по 2-3 раза в сутки.

Глубокие ожоги: применяют повязки с 20-30 % водным раствором диметилсульфоксида.

Кожно-пластическая хирургия: используют повязки с 10, 20 и 30 % водным раствором диметилсульфоксида на пересаженные кожные ауто- и гомотрансплантаты непосредственно после операций и в последующие дни послеоперационного периода до стойкого приживления трансплантата.

Консервирующая среда для хранения кожных гомотрансплантатов: применяют 5 % водный раствор диметилсульфоксида в растворе Рингера.

При повышенной чувствительности кожи и слизистых оболочек, а также при применении на коже лица используют 10-20 % водные растворы диметилсульфоксида.

Продолжительность лечения

Продолжительность применения препарата ДИМЕКСИД-БЕЛМЕД устанавливается лечащим врачом в зависимости от особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости. Рекомендуемая длительность курса лечения – 10-15 дней.

Применение у детей

Препарат противопоказан детям до 12 лет.

Дети 12-18 лет: применяют 20-30 % водные растворы препарата ДИМЕКСИД-БЕЛМЕД.

Способ применения

Только для наружного применения!

ДИМЕКСИД-БЕЛМЕД выпускается в виде концентрата, из которого перед применением готовят раствор необходимой концентрации.

Рекомендации по применению препарата ДИМЕКСИД-БЕЛМЕД:

1. Приготовить водный раствор препарата ДИМЕКСИД-БЕЛМЕД, руководствуясь следующей таблицей:

Содержание диметилсульфоксида	Количество частей диметилсульфоксида	Количество частей воды
10 %	1	9
20 %	1	4
25 %	1	3

30 %	3	7
40 %	2	3
50 %	1	1
90 %	9	1

2. В растворе необходимой концентрации смочить марлевую салфетку и наложить ее на пораженный участок на 20-30 мин. Компресс следует накладывать на пораженные участки, захватывая прилегающие здоровые кожные покровы.
3. Поверх салфетки наложить полиэтиленовую пленку и хлопчатобумажную или льняную ткань.

При наличии дополнительных вопросов касательно применения препарата ДИМЕКСИД-БЕЛМЕД проконсультируйтесь с врачом.

Если Вы применили препарата ДИМЕКСИД-БЕЛМЕД больше, чем следовало
Если Вы получили слишком большую дозу препарата ДИМЕКСИД-БЕЛМЕД, у Вас могут возникнуть следующие симптомы:

- повреждение желудочно-кишечного тракта,
- сонливость,
- головная боль,
- любые другие побочные реакции, перечисленные в разделе 4.

Если Вы считаете, что получили слишком большую дозу препарата ДИМЕКСИД-БЕЛМЕД, следует прекратить применение препарата, промыть поврежденное место водой и обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

При случайном приеме лекарственного препарата внутрь необходимо промыть желудок и немедленно обратиться к врачу. Следует помнить, что диметилсульфоксид быстро всасывается.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, ДИМЕКСИД-БЕЛМЕД может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Немедленно прекратите применение препарата ДИМЕКСИД-БЕЛМЕД и обратитесь к врачу, если у Вас наблюдаются следующие нежелательные реакции:
частота неизвестна (исходя из имеющихся данных, частоту возникновения определить невозможно):

- бронхоспазм (сужение дыхательных путей, которое сопровождается затруднением дыхания, удушьем и учащенным сердцебиением).

При применении препарата ДИМЕКСИД-БЕЛМЕД также могут возникать следующие нежелательные реакции:
частота неизвестна (исходя из имеющихся данных, частоту возникновения определить невозможно):

- жжение,
- зудящий дерматит,
- эритема,
- ощущение сухости кожи,
- усиление пигментации кожи,
- бессонница,
- чесночный запах выдыхаемого воздуха,
- тошнота,
- позывы на рвоту.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас появились нежелательные реакции, сообщите об этом своему лечащему врачу. Это также относится к любым нежелательным реакциям, которые не указаны в данном листке-вкладыше.

Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства (УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», <http://www.rceth.by>). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата ДИМЕКСИД-БЕЛМЕД

Храните препарат в недоступном для детей месте.

Храните препарат в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Храните препарат в оригинальной упаковке.

Срок годности – 2 года.

Не применяйте препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

При хранении при температуре 18 °С и ниже возможна кристаллизация диметилсульфоксида, которая не влияет на качество лекарственного препарата. Для расплавления кристаллов следует разогреть флакон с лекарственным средством в емкости с водой (температура воды – около 40 °С).

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Каждый флакон объемом 50 мл или 100 мл содержит действующее вещество: диметилсульфоксид – 55,0 г или 110,0 г соответственно.

Вспомогательные вещества: отсутствуют.

Внешний вид препарата ДИМЕКСИД-БЕЛМЕД и содержимое упаковки

ДИМЕКСИД-БЕЛМЕД, жидкость для наружного применения, представляет собой бесцветную жидкость или бесцветные кристаллы. Гигроскопичен.

ДИМЕКСИД-БЕЛМЕД выпускается по 50 или 100 мл во флаконах стеклянных вместимостью 50 или 100 мл соответственно, укупоренных пробками резиновыми и обкатанных колпачками алюминиевыми или алюмопластиковыми или алюминиевыми с пластиковой накладкой, или по 50 или 100 мл во флаконах стеклянных с винтовой горловиной вместимостью 50 или 100 мл соответственно, укупоренных пробками с уплотнительным элементом и крышками навинчиваемыми. Флакон вместе с листком-вкладышем помещен в пачку из картона.

Условия отпуска: без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

РУП «Белмедпрепараты»,

Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Фабрициуса, 30,

тел./факс: (+375 17) 220 37 16,

e-mail: medic@belmedpreparaty.com



Листок-вкладыш пересмотрен: