



Листок-вкладыш – информация для потребителя
ВЗОР, раствор (капли глазные) 0,5 мг/мл
Действующее вещество: тетрагидрозолина гидрохлорид

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Препарат назначен именно вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с вашими.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что собой представляет препарат ВЗОР и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата ВЗОР.
3. Применение препарата ВЗОР.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата ВЗОР.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

**1. Что собой представляет препарат ВЗОР,
и для чего его применяют**

Препарат ВЗОР представляет собой глазные капли, действующим веществом которых является тетрагидрозолина гидрохлорид (тетризолин). ВЗОР применяется для устранения отека и покраснения глаз при неинфекционном катаральном конъюнктивите, вызванном аллергической реакцией или воздействием дыма, ветра, хлорированной воды, света.

Детям младше 6 лет назначается под контролем врача.

2. О чем следует знать перед применением препарата ВЗОР

Не применяйте данный препарат, если:

- у вас аллергия на тетрагидрозолина гидрохлорид или любой другой компонент препарата, указанный в разделе 6,
- у вас узкоугольная глаукома (заболевание, сопровождающееся повышением внутриглазного давления),
- вы носите мягкие линзы (линзы необходимо снять перед закапыванием и установить не ранее, чем через 15 минут),
- у детей младше 2 лет.

Если вы не уверены, относится ли к вам что-либо из вышеперечисленного, сообщите об этом лечащему врачу перед применением препарата.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата ВЗОР проконсультируйтесь с лечащим врачом, если:

- у вас есть тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, такие как ишемическая болезнь сердца, повышенное артериальное давление, аритмия (нарушение ритма сердца), аневризма (выпячивание стенки сосуда),

- у вас гиперфункция щитовидной железы,
- у вас феохромоцитома (опухоль надпочечников),
- у вас сахарный диабет,
- вы принимаете препараты, способные повысить артериальное давление.

Если в течение 48 часов состояние не улучшается или раздражение и краснота сохраняются или нарастают, следует прекратить применять препарат и обратиться к врачу. При появлении интенсивных болей в глазах, головной боли, изменении или потере зрения, внезапном появлении «плавающих» пятен перед глазами, покраснения глаз, боли при воздействии света или двоения в глазах немедленно обратитесь к врачу. Не применяйте препарат ВЗОР, если раздражение или краснота связаны с серьезными заболеваниями органа зрения: инфекция, инородное тело или химическая травма роговицы.

Чрезмерное или продолжительное использование препарата может привести к повышенному покраснению глаз.

Не используйте препарат, если раствор поменял цвет или стал мутным.

Вспомогательные вещества, наличие которых нужно учитывать

В состав препарата ВЗОР входит вещество бензалкония хлорид, которое может вызвать раздражение глаз и изменить цвет мягких контактных линз.

Если вы носите контактные линзы

Избегайте контакта с мягкими контактными линзами. Перед применением препарата снимите контактные линзы и наденьте их обратно не ранее, чем через 15 минут. Препарат может изменять цвет мягких контактных линз.

Дети

Препарат ВЗОР противопоказан детям младше 2 лет. Следует избегать длительного применения препарата и превышения рекомендуемой дозы, в особенности у детей. Применять препарат у детей следует с осторожностью и только под контролем врача.

Другие препараты и ВЗОР

Проконсультируйтесь с лечащим врачом, если вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать любые другие препараты. Это относится и к любым препаратам, отпускаемым без рецепта врача.

Проконсультируйтесь с лечащим врачом, если вы принимаете:

- мапротилин (антидепрессант),
- трициклические антидепрессанты (например, амитриптилин, имипрамин),
- производные фенотиазина (препараты, которые применяют при лечении психических расстройств),
- ингибиторы моноаминооксидазы (MAO) (например, изокарбоксазид, транилципромин),
- препараты, повышающие артериальное давление,
- другие офтальмологические препараты.

Применение препарата ВЗОР одновременно с ингибиторами МАО и трициклическими антидепрессантами может привести к повышению артериального давления.

Беременность, грудное вскармливание и fertильность

Если вы беременны, думаете, что можете быть беременны, планируете беременность, или кормите грудью перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом. Препарат ВЗОР не следует использовать во время беременности или кормления грудью, за исключением случаев, когда это абсолютно необходимо.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат ВЗОР может вызывать расширение зрачка и затуманенность зрения, что может повлиять на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

3. Применение препарата ВЗОР

Всегда применяйте этот препарат в полном соответствии с рекомендациями врача. При появлении сомнений проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Доза

По 1 или 2 капли в пораженный глаз 2-3 раза в сутки.

Применение у детей и подростков:

У детей старше 2 лет препарат применяют в тех же дозах, что и у взрослых.

Детям в возрасте до 6 лет препарат назначается под контролем врача.

Детям в возрасте до 12 лет препарат следует применять под присмотром взрослых.

Применение у пожилых пациентов:

Коррекция дозы не требуется.

Длительность применения

ВЗОР следует применять только при легком раздражении глаз.

Не применяйте ВЗОР более 4 дней без консультации врача.

Если ваше состояние не улучшилось или раздражение и краснота нарастают, прекратите применение препарата и обратитесь к врачу.

Следует избегать длительного применения препарата и превышения рекомендуемой дозы, в особенности у детей.

Если вам кажется, что эффект препарата слишком сильный или слишком слабый, проконсультируйтесь с врачом.


Способ применения

Препарат ВЗОР предназначен только для закапывания в глаза.

При применении препарата рекомендуется слегка прижать пальцем внутренний угол глаза для закрытия носослезного канала и не открывать глаз в течение 2 минут после применения препарата.

Перед применением внимательно прочитайте этот раздел и последовательно выполните операции, представленные ниже в тексте и на рисунках 1-6.

1. Достаньте из упаковки флакон.
2. Если флакон укупорен колпачком алюминиевым: расположите ножницы под углом 45 градусов к крышке, подцепив её нижний край, движением, направленным вверх, снимите алюминиевый колпачок вместе с резиновой крышкой (рис. А 1-2).
3. Если флакон укупорен колпачком с пластиковой накладкой или колпачком комбинированным: с усилием потяните за пластиковую накладку со стороны надрезов, поднимая ее вертикально, затем резко потяните вниз вдоль флакона для нарушения целостности колпачка. Снимите алюминиевый колпачок и резиновую пробку (рис. Б 1-2).
4. Достаньте капельницу из упаковки и плотно наденьте ее на флакон (рис. 3).
5. Переверните флакон строго вертикально для удаления воздушного пузырька и подождите несколько секунд. В случае большого пузырька верните флакон в исходное положение, а затем медленно повторите действие, аккуратно постучав по дну флакона (рис. 4).
6. Закапайте капли, нажимая указательным и большим пальцем на пипетку (рис. 5). Не прикасайтесь пипеткой к глазу или другим поверхностям – это может привести к инфицированию раствора.
7. Перевернув флакон, закройте пипетку специальной пробкой (рис. 6).



СОГЛАСОВАНО
 МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
 Приказ Министерства здравоохранения
 Республики Беларусь



Рис. 1




Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4




Рис. 5



Рис. 6

Если вы применили препарата ВЗОР больше, чем следовало

В случае передозировки препарата ВЗОР немедленно обратитесь к врачу.

При закапывании препарата в глаза риск передозировки минимален. В случае значительного превышения рекомендуемой дозы или проглатывания препарата могут наблюдаться следующие симптомы передозировки: расширение зрачка, тошнота, синюшный оттенок кожи (цианоз), лихорадка, судороги, учащенное сердцебиение, нерегулярный сердечный ритм, остановка сердца; повышение артериального давления, отек легких, нарушения дыхания, нарушения функции центральной нервной системы, кома.

Сообщалось о единичных случаях снижения артериального давления, замедления сердцебиения, сонливости, снижения температуры тела.

Риск появления симптомов передозировки высок у новорожденных и маленьких детей, особенно при проглатывании.

При местном применении результатом передозировки препарата ВЗОР могут быть чувство жжения и увеличение кровенаполнения сосудов глаза (гиперемия). В случае передозировки рекомендуется промыть глаз физиологическим раствором.

Если вы забыли применить препарат ВЗОР

Если вы забыли закапать ВЗОР, сделайте это в следующий раз в обычное время. Не закапывайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, ВЗОР может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Могут возникать следующие нежелательные реакции:

Часто (могут проявляться менее чем у 1 из 10 человек):

- раздражение слизистой оболочки глаз (боль, покалывание, жжение),
- нарушение зрения.

Частота неизвестна:

- повышенное слезотечение,
- расширение зрачков,
- реакции в месте введения (включая жжение в глазах и области около глаз, покраснение, раздражение, отек, боль, зуд).

Возможно развитие аллергических реакций.

Продолжительное или частое использование препарата ВЗОР вызывает привыкание и может явиться причиной увеличения кровенаполнения сосудов глаза (гиперемии).

После прекращения терапии кровеносные сосуды могут повторно расширяться (вазодилатация).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше.

Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства (УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении МЗ РБ», <http://www.rceth.by>). Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата ВЗОР

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном и невидимом для детей месте.

Срок годности – 2 года.

Не использовать по истечении срока годности.

Вскрытый флакон хранить в оригинальной упаковке при температуре от 15 °C до 25 °C в течение 4 недель.

Не выливайте остатки препарата в канализацию и не выбрасывайте с бытовыми отходами. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1 флакон содержит действующее вещество тетрагидрозолина гидрохлорид – 5 мг.

Вспомогательные вещества: борная кислота, натрия тетраборат, натрия хлорид, бензалкония хлорид, динатрия эдетат, вода для инъекций.

Внешний вид препарата ВЗОР и содержимое упаковки

ВЗОР, раствор (капли глазные) 0,5 мг/мл, – прозрачный бесцветный раствор.

По 10 мл во флаконы бесцветного стекла, укупоренные пробками резиновыми. Флаконы обкатывают колпачками алюминиевыми, или колпачками алюминиевыми с пластиковой накладкой (неокрашенной или окрашенной), или колпачками комбинированными из алюминия и пластмассы. На флакон наклеивают этикетку самоклеющейся. Флакон в комплекте с соответствующей крышкой-калельницей и листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Условия отпуска: без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

РУП «Белмедпрепараты»,

Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Фабрициуса, 30,

тел./факс:(+375 17) 220 37 16

e-mail: medic@belmedpreparaty.com



Листок-вкладыш пересмотрен: