

НД РБ

2848Б-2020



Инструкция по медицинскому применению листок-вкладыш

Лорсепт-Интенсив, 1,5 мг/мл + 5,0 мг/мл, спрей для слизистой оболочки полости рта
Действующие вещества: бензидамина гидрохлорид и цетилпиридиния хлорид

Перед применением данного препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

- Всегда применяйте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 3 дней вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша:

1. Что из себя представляет препарат Лорсепт-Интенсив и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Лорсепт-Интенсив.
3. Применение препарата Лорсепт-Интенсив.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Лорсепт-Интенсив.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ ЛОРСЕПТ-ИНТЕНСИВ И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Лекарственный препарат Лорсепт-Интенсив содержит бензидамина гидрохлорид и цетилпиридиния хлорид и относится к средствам для лечения заболеваний полости рта и глотки; антисептическим средствам.

Лорсепт-Интенсив применяется у взрослых и детей старше 6 лет для местного симптоматического лечения инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки (инфекционное заболевание, которое проявляется местным воспалением одной или нескольких миндалин глотки, чаще небных – тонзиллит; воспаление слизистой оболочки глотки и миндалин – фарингит; воспаление слизистой оболочки в полости рта – стоматит; воспаление десен, протекающее без нарушения целостности зубодесневого соединения – гингивит).

Если улучшение не наступило или вы чувствуете ухудшение, через 3 дня необходимо обратиться к врачу.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА ЛОРСЕПТ-ИНТЕНСИВ

Не применяйте препарат Лорсепт-Интенсив если у вас:

- аллергия на бензидамин и/или цетилпиридиний или любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6;
- детский возраст до 6 лет.

Особые указания и меры предосторожности:

Перед применением препарата Лорсепт-Интенсив проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Лекарственные формы для местного применения могут вызвать аллергические реакции, особенно при длительной терапии. В этом случае вам рекомендуется прекратить лечение и проконсультироваться с врачом для назначения соответствующей терапии.

Не применяйте Лорсепт-Интенсив одновременно с анионными соединениями (например, присутствующими в зубной пасте). Соответственно, не применяйте препарат непосредственно до или после чистки зубов.

Избегайте попадания лекарственного препарата в глаза.

Избегайте вдыхания или проглатывания лекарственного препарата во время его использования.

Цетилпиридиния хлорид не следует использовать при повреждении слизистых оболочек из-за возможных проблем с заживлением ран.

Применяйте Лорсепт-Интенсив у детей в возрасте от 6 до 12 лет под контролем взрослых.

Вспомогательные вещества

Лекарственный препарат содержит небольшое количество этилового спирта: 26 мг/однократная доза.

Дети и подростки:

Препарат Лорсепт-Интенсив противопоказан для применения у детей младше 6 лет.

Другие препараты и препарат Лорсепт-Интенсив:

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты, включая лекарственные препараты, приобретенные без рецепта.

Избегайте одновременного применения с препаратами из группы антисептиков.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность:

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что можете быть беременны, или планируете беременность, перед началом применения препарата Лорсепт-Интенсив проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Беременность

Данные о применении бензидамина гидрохлорида и цетилпиридиния хлорида у беременных женщин ограничены. Не принимайте этот препарат, если вы беременны.

Грудное вскармливание

Данные о наличии бензидамина гидрохлорида или его метаболитов в грудном молоке отсутствуют. Не может быть исключен риск для новорожденных и грудных детей. Вам следует обсудить с лечащим врачом решение о прекращении грудного вскармливания или отмены препарата.


Управление транспортными средствами и работа с механизмами:

Препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ЛОРСЕПТ-ИНТЕНСИВ

Всегда применяйте данный препарат в полном соответствии с данным листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Для достижения оптимального эффекта не применяйте Лорсепт-Интенсив непосредственно до или сразу после чистки зубов. Не превышайте рекомендуемые дозы.

Рекомендуемая доза (взрослые):

Для получения однократной дозы нажмите на дозатор один или два раза, оросите воспаленный участок. При необходимости процедуру повторять каждые 2 часа 3 - 5 раз в сутки.

Применение у детей и подростков:

Препарат противопоказан детям младше 6 лет.

Дети в возрасте от 6 до 12 лет: для получения однократной дозы нажмите на дозатор один раз, оросите воспаленный участок. При необходимости процедуру повторять каждые 2 часа 3 - 5 раз в сутки.

У детей в возрасте от 6 до 12 лет лекарственный препарат применять под контролем взрослых.

Дети в возрасте от 12 лет и старше: для получения однократной дозы нажмите на дозатор один или два раза, оросите воспаленный участок. При необходимости процедуру повторять каждые 2 часа 3 - 5 раз в сутки.

Применение у пожилых пациентов:

Коррекция дозы не требуется. Не следует превышать рекомендуемые дозы.

Путь и способ введения:

Перед применением снимите пластиковую крышку. Поверните насадку-распылитель на 90 градусов. Перед первым применением спрея несколько раз нажмите на дозатор до появления струи. Широко откройте рот, направьте насадку-распылитель в горло, задержите дыхание и нажмите на дозатор 1 - 2 раза.

Если лекарственный препарат не применялся длительное время (как минимум в течение одной недели), то однократно нажмите на дозатор до появления струи.

Избегайте вдыхания лекарственного препарата.

Однократное нажатие соответствует 0,1 мл спрея и содержит 0,15 мг бензидамина гидрохлорида и 0,5 мг цетилпиридиния хлорида (в форме моногидрата).

Продолжительность терапии:

Не применяйте Лорсепт-Интенсив более 7 дней. Если улучшение не наступило или вы чувствуете ухудшение после 3 дней лечения, обратитесь к врачу.

Если вы применили больше препарата Лорсепт-Интенсив, чем следовало:

При приеме доз, превышающих рекомендуемые, следует немедленно сообщить об этом врачу или обратиться в ближайшее учреждение здравоохранения.

Возможные симптомы передозировки:

Симптомы связанные с передозировкой бензидамина: возбужденное состояние, судороги, повышенное потоотделение, атаксия, тремор и рвота. Также могут наблюдаться галлюцинации и психоз.

Признаки и симптомы интоксикации в результате приема внутрь значительных количеств цетилпиридиния хлорида: тошнота, рвота, нарушения дыхания, синюшная окраска кожи и слизистых оболочек (цианоз), удушье вследствие паралича дыхательных мышц, угнетение центральной нервной системы, низкое кровяное давление (артериальная гипотензия), кома. Смертельная доза для человека составляет около 1 - 3 г (что соответствует 2000 - 6000 разовым дозам спрея).

Лечение:

Специфический антидот отсутствует. Лечение симптоматическое.

Если вы забыли применить препарат Лорсепт-Интенсив


Не применяйте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную. Интервал между применениями доз должен составлять не менее 2 часов.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам данный препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите применение лекарственного препарата Лорсепт-Интенсив и немедленно обратитесь к



врачу, если у вас или у вашего ребенка наблюдается один из следующих симптомов, поскольку это может указывать на развитие серьезных аллергических реакций (анафилактические реакции):

- затруднение дыхания,
- боль и чувство стеснения в груди, и/или ощущение головокружения/обморока,
- сильный зуд кожи или волдыри на коже,
- отек лица, губ, языка и/или горла.

При приеме препарата могут возникать следующие нежелательные реакции:

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000): сужение просвета мелких бронхов и бронхиол (бронхоспазм), волдыри на коже (крапивница), повышенная чувствительность кожи к солнечному свету (фоточувствительность).

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000): раздражение слизистой оболочки полости рта, ощущение жжения в полости рта.

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно): реакции гиперчувствительности, чувство жжения или онемения (потери чувствительности) слизистой оболочки полости рта.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных.

Контактные данные для сообщений о нежелательных реакциях: «РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» <http://www.rceth.by>; адрес электронной почты: rcpl@rceth.by».

Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ЛОРСЕПТ-ИНТЕНСИВ

Храните препарат в недоступном и незаметном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.


Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Срок годности после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.

Условия хранения:

Храните препарат при температуре не выше 25 °С.

Не выливайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать препарат, который больше не потребуется. Эти меры способствуют защите окружающей среды.



6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат Лорсефт-Интенсив содержит:

Действующими веществами препарата являются бензидамина гидрохлорид и цетилпиридиния хлорид (в форме цетилпиридиния хлорида моногидрата).

В 1 мл препарата содержится 1,5 мг бензидамина гидрохлорид и 5,0 цетилпиридиния хлорид (в форме цетилпиридиния хлорида моногидрата).

Вспомогательные вещества: глицерин, этанол (в виде 96 % раствора), макроголглицерина гидроксистеарат, сахарин натрий, масло мяты перечной, вода очищенная.

Внешний вид препарата Лорсефт-Интенсив и содержимое его упаковки:

Лорсефт-Интенсив представляет собой прозрачную, бесцветную или желтоватого цвета жидкость.

По 30 мл во флаконе полиэтиленовом укупоренном насадкой-распылителем для спреев с защитным колпачком с инструкцией по применению в пачке картонной.

Отпуск из аптек

Без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель:

ООО «Рубикон», Республика Беларусь,
210002, г. Витебск, ул. М. Горького, 62Б,
тел/факс: +375 (212) 36-37-06, тел.: +375 (212) 36-47-77,
e-mail: secretar@rubikon.by

Данный листок-вкладыш пересмотрен:
02/2023

НД РБ

2848Б-2020

