

1873 Б-2018



Листок-вкладыш – информация для потребителя
ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА,
настойка для местного применения и для ингаляций

Перед применением препарата полностью прочтайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

- Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 7 дней, вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА
3. Применение препарата ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

**1. Что из себя представляет препарат ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА,
и для чего его применяют**

Препарат ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА обладает антибактериальной активностью по отношению к стафилококкам, а также антисептическим и противовоспалительным действием.

Препарат ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА применяют в составе комплексной терапии воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, глотки и полости рта (трахеитов, ларингитов, фарингитов, гингивитов и стоматитов).

Если улучшение не наступило или вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

**2. О чем следует знать перед применением
препарата ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА**

Не применяйте препарат ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА:

- если у вас гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата или любым другим компонентам препарата (перечисленным в разделе 6 листка-вкладыша);
- если вы беременны или кормите ребенка грудью;
- у детей до 12 лет.

Не применяйте препарат ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА для ингаляций, если:

- у вас бронхиальная астма или бронхоспазм (сужение бронхов);
- у вас коклюш.

Особые указания и меры предосторожности

Перед началом применения препарата ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Проконсультируйтесь с лечащим врачом, если:

- у вас были какие-либо заболевания печени, алкогольная зависимость;
- у вас эpileпсия.

Препарат ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА содержит этанол!

Лекарственный препарат содержит не менее 64,0 % (об/об) этанола, что соответствует от 256 мг до 385 мг на разовую дозу (10-15 капель), что эквивалентно от 5,69 г до 8,56 г пива или от 2,56 г до 3,85 г вина на дозу.

Препарат вреден для лиц, страдающих алкогольной зависимостью.

Наличие этилового спирта необходимо учитывать беременным и кормящим женщинам, детям и группам высокого риска, таким как пациенты с заболеваниями печени или эpileпсией.

Если при применении симптомы вашего заболевания сохраняются или происходит ухудшение состояния (развиваются нарушения дыхания, лихорадка, появляется гнойная мокрота), прекратите применение препарата и обратитесь к врачу.

Дети

Препарат ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА противопоказан детям младше 12 лет.

Не допускайте попадания препарата на область лица (особенно область носа) детей из-за риска развития бронхоспазма.

Другие препараты и препарат ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что вы принимаете или недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты, включая препараты, полученные без рецепта или препараты растительного происхождения.

Препараты из листьев эвкалипта могут изменять активность ферментов печени, участвующих в метаболизме лекарственных препаратов.

Беременность, грудное вскармливание и fertильность

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Препарат ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА противопоказан к применению в период беременности.

Препарат ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА противопоказан к применению в период грудного вскармливания. Если вы начали применять препарат ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА, грудное вскармливание необходимо прекратить.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами


Этиловый спирт, содержащийся в данном лекарственном препарате, может повлиять на вашу способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

3. Применение препарата ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

1873Б-2018

Лекарственный препарат ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА применяется для полоскания и паровых ингаляций.



Рекомендуемая доза составляет 10-15 капель настойки.

Количество процедур и продолжительность курса лечения, которые вам подходят, определит ваш лечащий врач в зависимости от характера и степени тяжести заболевания.

Не рекомендуется применять препарат более 1 недели.

Для полосканий разводят 10-15 капель настойки в 200 мл теплой кипяченой воды.

Паровые ингаляции проводят с помощью ингаляторов любого типа, используя настойку в неразведенном состоянии или в разведении из расчета 10-15 капель в 200 мл теплой кипяченой воды, в объеме раствора, необходимом для проведения ингаляции.

Применение у детей и подростков

Препарат ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА противопоказан детям младше 12 лет.

Если вы применили препарата ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА больше, чем следовало

Передозировка может привести к опасным для жизни отравлениям.

Основные симптомы при передозировке препаратом: тошнота, боль в животе спастического характера, снижение кровяного давления, расстройства кровообращения, бронхоспазм.

В случае передозировки немедленно обратитесь к врачу.

Если вы забыли применить препарат ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА

Если вы забыли выполнить процедуру (полоскание или паровую ингаляцию) в назначенное время, выполните ее как можно быстрее.

Однако если наступило время для следующей процедуры, не увеличивайте дозу препарата и проведите процедуру как обычно.

Не используйте двойную дозу препарата (две дозы в одно и то же время), если вы пропустили процедуру!

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Препарат может вызывать другие, нежели указанные ниже нежелательные реакции.

Частота нижеперечисленных нежелательных реакций является *неизвестной* (исходя из имеющихся данных, частоту возникновения определить невозможно):

- развитие местных аллергических реакций (гиперемия, сыпь, зуд и отек кожи);
- тошнота, рвота, диарея;
- контактный дерматит (в области губ).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом, работником аптеки или медицинской сестрой. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

1873Б-2018

Республика Беларусь
 УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»
 г. Минск, 220037, Товарищеский пер., 2а
 Телефон: +375 (17) 242-00-29

СОГЛАСОВАНО
 МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
 Приказ Министерства здравоохранения
 Республики Беларусь

5. Хранение препарата ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном и невидном для детей месте.

В процессе хранения возможно выпадение осадка.

Беречь от огня.

Не применять препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Не выбрасывать препарат в канализацию. Уточнить у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволяют защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Состав на один флакон 30 мл:

Активный компонент: эвкалипта прутовидного листья – 6 г; *вспомогательное вещество:* этиanol (этиловый спирт) 70 % – до 30 мл настойки.

Состав на один флакон 50 мл:

Активный компонент: эвкалипта прутовидного листья – 10 г; *вспомогательное вещество:* этиanol (этиловый спирт) 70 % – до 50 мл настойки.

Внешний вид препарата ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА и содержимое упаковки

ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА представляет собой прозрачную жидкость от зеленовато-коричневого до бурого или зеленовато-бурого цвета, со специфическим запахом.

В процессе хранения возможно выпадение осадка.

По 30 мл или 50 мл во флаконах из светозащитного стекла, укупоренных пробками-капельницами и крышками навинчиваемыми.

По 30 мл или 50 мл во флаконах из светозащитного стекла, укупоренных пробками-капельницами и крышками укупорочно – навинчиваемыми с контролем первого вскрытия. Каждый флакон с этикеткой самоклеящейся вместе с листком - вкладышем помещен в пачку из картона. Флаконы с этикеткой многостраничной помещены в ящики из гофрированного картона.

Условия отпуска: без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

РУП «Белмедпрепараты»,
 Республика Беларусь, 220007, г. Минск,
 ул. Фабрициуса, 30, тел./факс:(+375 17) 220 37 16,
 e-mail: medic@belmedpreparaty.com



Листок-вкладыш пересмотрен: