

ПИКОВИТ КИДС текст листка - вкладыша

**Листок-вкладыш – информация для потребителя
ПИКОВИТ® КИДС**



Перед приемом препарата полностью прочтайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.
- Препарат предназначен именно вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с вашими.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША:

1. Что из себя представляет препарат Пиковит Кидс, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед приемом препарата Пиковит Кидс
3. Применение препарата Пиковит Кидс
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата Пиковит Кидс
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1. Что такое Пиковит Кидс и для чего он используется

Таблетки, покрытые оболочкой, Пиковит Кидс содержат десять витаминов в сочетании с минералами: кальцием и фосфором.

Витамины и минералы являются важными факторами метаболических процессов в организме, необходимы для нормального роста и развития, для поддержания и укрепления здоровья.

Витамины группы В (B1, B2, B6, пантотеновая кислота и никотинамид) принимают участие в метаболизме углеводов, жиров и белков, а также в функционировании нервной системы. Витамин А необходим для развития эпителиальных клеток и синтеза зрительного пигмента. Витамин D играет важную роль в поддержании баланса кальция и способствует правильной минерализации костей и зубов. Витамин С повышает всасывание железа и участвует во многих окислительно-восстановительных процессах в организме. Кальций и фосфор играют ключевую роль в минерализации костей и зубов.

Таблетки, покрытые оболочкой, Пиковит Кидс применяются для восполнения повышенной потребности организма в витаминах, кальции и

5513 - 2016

ПИКОВИТ КИДС текст листка - вкладыша фосфоре, компенсируют дефицит этих веществ в рационе, когда общие меры (разнообразное и регулярное питание) не является достаточным. Пиковит Кидс таблетки, покрытые оболочкой, имеют очень приятный вкус и в основном предназначены для детей:

- при отсутствии аппетита;
- при переутомлении;
- в комплексной терапии в качестве вспомогательных веществ при приеме антибиотиков;
- в качестве витаминно-минеральной добавки при несбалансированном и неполнценном питании.

Пиковит Кидс таблетки, покрытые оболочкой, не являются заменой сбалансированного и разнообразного питания. Поэтому важно, чтобы питание вашего ребенка было сбалансированное и разнообразное даже во время применения Пиковит Кидс, таблеток, покрытых оболочкой.



2. Что вы должны знать перед применением Пиковит Кидс

Не принимайте Пиковит Кидс

- если у вас аллергия (повышенная чувствительность) к активным веществам или любым другим ингредиентам Пиковит Кидс.
- если у вас гипервитаминоз А или D.

Пиковит Кидс не рекомендуются детям до 4-х лет.

Соблюдайте особую осторожность при приеме Пиковит Кидс


- если вы страдаете сахарным диабетом, вы можете принимать Пиковит Кидс, но должны иметь в виду, что суточная доза содержит от 2,4 до 4,2 г сахара. Каждая таблетка, покрытая оболочкой, содержит 0,6 г сахара.
- если у вас есть заболевания печени, острое воспаление почек, сердечная декомпенсация, желчекаменная болезнь, хронический панкреатит, аллергические заболевания, идиосинкразия, новообразования.

Перед совместным применением с другими витаминами, витамино-минеральными и/или минеральными препаратами проконсультируйтесь с врачом.

При приеме других лекарственных средств

Пожалуйста, расскажите врачу или фармацевту, если вы принимаете или недавно принимали любые другие лекарства, в том числе лекарственные средства, полученные без рецепта.

Пиковит Кидс содержит кальций, который задерживает всасывание в кишечнике антибиотиков группы тетрациклинов и антимикробные средства из группы фторхинолонов. Также входящий в состав рибофлавин препятствует абсорбции и снижает эффективность антибиотиков. Поэтому интервал между приемом Пиковит Кидс и антибиотиков/антимикробных средств должен составлять 2-3 часа.



ПИКОВИТ КИДС текст листка - вкладыша

Пиридоксин снижает эффективность леводопы, если пациент принимает только леводопу.

Во избежание передозировки жирорастворимых витаминов не рекомендуется принимать Пиковит Кидс совместно с другими витаминами или витаминно-минеральными комплексами.



Беременность и кормление грудью

Перед применением каких-либо

лекарственных средств

проконсультируйтесь с врачом.

Беременные женщины и кормящие матери должны принимать витамины и минералы по назначению врача. Дозы витаминов в таблетках, покрытых оболочкой, Пиковит Кидс адаптированы для детей.

Вождение автомобиля и управление механизмами

О влиянии препарата на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не сообщалось.

Пиковит® Кидс не влияет на моторную функцию детей.

Важная информация о некоторых из вспомогательных веществ Пиковит Кидс.

Пиковит Кидс содержит лактозу, сахарозу, глюкозу, сорбит (E420) и азокраситель Е124.

Если у вас непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство.

Пиковит Кидс содержит 134,20 мг сорбита в каждой таблетке, покрытой оболочкой. Сорбит является источником фруктозы.


Если ваш врач сообщил, что у вас (или вашего ребенка) непереносимость некоторых сахаров, или если вам поставили диагноз наследственной непереносимости фруктозы (HFI), редкого генетического заболевания, при котором человек не может расщеплять фруктозу, поговорите со своим врачом до того, как вы (или ваш ребенок) примете или получите это лекарство.

Азокраситель Е124 может вызвать аллергические реакции. Он может отрицательно повлиять на активность и концентрацию внимания детей.

3. Как принимать Пиковит Кидс

Всегда принимайте Пиковит Кидс так, как назначил ваш доктор. Если вы не уверены, свяжитесь со своим врачом.

Обычная доза для детей от 4 до 6 лет составляет ежедневно по 1 таблетке, 4 раза в сутки, максимально – 5 раз в сутки. Прием таблеток осуществляется под контролем взрослых. Для детей в возрасте от 7 до 14 лет: по 1 таблетке 5 раз в сутки. Максимум – 7 таблеток в сутки (по рекомендации врача).



ПИКОВИТ КИДС текст листка - вкладыша

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Дети должны держать таблетку во рту до полного рассасывания. При нарушении аппетита Пиковит Кидс принимается в течение 2 месяцев, в других случаях должен приниматься периодически по необходимости.

Если вы приняли больше таблеток Пиковит Кидс, чем следовало.

При приеме в рекомендованных дозах интоксикация не предполагается. Длительное применение очень больших доз может привести к гипервитаминозу А и D, хотя риск развития передозировки при приеме Пиковит Кидс минимален. При кратковременном использовании больших доз витамина А симптомы гипервитаминоза могут проявляться в виде болей в животе, анорексии, рвоты, помутнения зрения, головной боли, несогласованных движений и покраснения кожи. Длительное применение больших доз витамина А может вызвать истончение и зуд кожи, потрескавшиеся губы, конъюнктивит, нарушение зрения, боль в суставах, головная боль, рвота.

При передозировке витамина D могут развиться анорексия, потеря веса, утомляемость, дезориентация, рвота, диарея или запор, металлический привкус, сухость во рту и повышенная жажда.

Если вы забыли принять Пиковит Кидс

Не принимайте двойную дозу, если вы забыли принять таблетки.

Если у вас возникли вопросы по использованию данного лекарственного средства, спросите у вашего доктора или фармацевта.

4. Возможные нежелательные реакции

Как и все лекарственные средства Пиковит Кидс может вызывать побочные эффекты

- очень редкие (<1/10000);
- очень редкие: реакции гиперчувствительности.


При развитии реакций повышенной чувствительности прием препарата необходимо прекратить и обратиться к вашему врачу.

- частота неизвестна: анафилактическая реакция, которая может проявляться отеком лица, губ и век, а также затрудненное дыхание в следствии бронхоспазма.

При развитии реакций повышенной чувствительности прием препарата необходимо прекратить и проконсультироваться с врачом. В случае развития анафилактической реакции следует обратиться за неотложной медицинской помощью.

Сообщения о нежелательных реакциях

Если у вас появились какие-либо побочные реакции, сообщите об этом лечащему врачу. Побочные реакции включают в себя любые возможные побочные реакции, в том числе не указанные в данном листке-вкладыше.



ПИКОВИТ КИДС текст листка - вкладыша

Сообщая о побочных эффектах, вы можете помочь в сборе информации о безопасности лекарственного средства Пиковит Кидс.

5. Хранение препарата Пиковит Кидс

Хранить при температуре не выше 25 °C.

Хранить в оригинальной упаковке в защищенном от света и влаги месте.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности 3 года.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Не выбрасывайте препарат в водопровод или канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не требуются. Эти меры позволяют защитить окружающую среду.

6. Содержание упаковки и прочие сведения

1 таблетка, покрытая оболочкой, Пиковит Кидс содержит


Действующие вещества:

Витамин А (Витамин А, пальмитат концентрат, синтетический, масляная форма (1,7 млн. МЕ/г))	600МЕ (0,35 мг)
Витамин D ₃ (Холекальциферол концентрат (масляная форма) (1 млн. МЕ/г))	80МЕ (0,08 мг)
Витамин С (Аскорбиновая кислота)	10,00 мг
Витамин В ₁ (Тиамина нитрат)	0,25 мг
Витамин В ₂ (Рибофлавин)	0,30 мг
Витамин В ₆ (Пиридоксина гидрохлорид)	0,30 мг
Витамин В ₁₂ (Цианокобаламин 0,1% в манните)	0,20 мкг (0,20 мг)
Витамин РР (Никотинамид)	3,00 мг
Витамин В ₉ (Фолиевая кислота)	0,04 мг
Витамин В ₅ (Кальция пантотенат)	1,20 мг
Кальция гидрофосфат	43,00 мг

Перечень вспомогательных веществ

Лактоза моногидрат, ароматизатор апельсиновое масло 05073 (вкусоароматические продукты и натуральные вкусоароматические вещества, антиоксидант (E320)), полисорбат 80, глицерин, касторовое масло нерафинированное, лимонная кислота, сорбит, глюкоза жидккая (по сухому веществу), противопенный агент 1510, магния стеарат, капол 600 фарма, парафин жидкий, повидон, сахароза, краситель Пунцовский 4R (E124), титана диоксид (E171).

Внешний вид препарата Пиковит Кидс и содержимое упаковки



НД РБ

5513 - 2016

ПИКОВИТ КИДС текст листка - вкладыша

Описание: круглые, двояковыпуклые таблетки, покрытые оболочкой красно-розового цвета.

Картонная коробка с 30 таблетками (2 блистера из ПВХ/ПВДХ/ПВХ пленки и алюминиевой фольги по 15 таблеток) вместе с листком-вкладышем.

Условия отпуска

Без рецепта врача.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Держатель регистрационного удостоверения и производитель
KRKA d.d., Ново место, Шмарешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения

12.01.2024г.

